雑草発生田は適期にカメムシ2回防除

アカスジカスミカメ防除のため、ノビエやホタルイ等の雑草発生田では
出穂期10日後頃と同24日後頃の2回防除が必須です

雑草発生田はアカスジカスミカメが多発

▲ノビエ

▲イヌホタルイ

出穂期10日後頃
スタークル・アルバリン液剤・粉剤

＋

出穂期24日後頃
キラップフロアブル・粉剤

1回防除のみ

1等米

2～3等米

無防除

規格外

イネ科植物が主体の牧草地や休耕田等が隣接している場合も同様です！

８月の薬剤散布後に畦畔・農道の草刈りを！

6月			7月			8月			9月		
上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬

6月上旬から稲の出穂期10～15日前まで

出穂期

薬剤散布

薬剤散布

収穫期2週間前

収穫期

草刈り2～3回

草刈り

草刈り



8月下旬の畦畔

イネ科雑草の穂はアカスジカスミカメの増殖源になります！
薬剤散布後に草刈りをして、カメムシの増殖源をなくしましょう！

平成25年2月　秋田県農業試験場 編集　　秋田県植物防疫協会 発行