

定期調査一覧表
秋田県果樹試験場(本場)

(令和5年11月13日現在)

樹種	品種	項目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年	前年
リンゴ	つがる 収穫日 9月6日 平年差 -2日 前年差 -1日	果重(g)	277.2	300.3	317.6	92%	87%
		縦径(cm)	7.63	8.03	8.11	95%	94%
		横径(cm)	8.91	9.04	9.26	99%	96%
		硬度(lbs)	12.8	13.4	12.6	96%	102%
		糖度(Brix %)	13.4	13.0	12.7	103%	106%
		リンゴ酸(g/100ml)	0.270	0.292	0.301	92%	90%
	やたか 収穫日 9月27日 平年差 ±0日 前年差 ±0日	果重(g)	278.5	350.6	349.8	79%	80%
		縦径(cm)	7.72	8.41	8.47	92%	91%
		横径(cm)	8.81	9.41	9.38	94%	94%
		硬度(lbs)	12.4	12.6	12.1	98%	102%
		糖度(Brix %)	13.2	13.2	11.5	100%	115%
		リンゴ酸(g/100ml)	0.298	0.356	0.263	84%	113%
	王林 収穫日 11月1日 平年差 -1日 前年差 -6日	果重(g)	330.3	322.5	331.3	102%	100%
		縦径(cm)	8.76	8.67	8.73	101%	100%
		横径(cm)	8.89	8.71	8.94	102%	99%
		硬度(lbs)	15.8	14.9	14.6	106%	108%
		糖度(Brix %)	14.3	14.2	13.5	101%	106%
		リンゴ酸(g/100ml)	0.272	0.292	0.278	93%	98%
	ふじ 収穫日 11月13日 平年差 +2日 前年差 -7日	果重(g)	283.1	343.4	313.7	82%	90%
		縦径(cm)	7.66	8.35	8.01	92%	96%
		横径(cm)	8.71	9.24	8.99	94%	97%
		硬度(lbs)	15.0	14.1	13.5	106%	111%
		糖度(Brix %)	14.8	14.1	14.7	105%	101%
		リンゴ酸(g/100ml)	0.357	0.337	0.331	106%	108%

※平年値:平成25年～令和4年(10か年)の平均値。

- ・「ふじ」、「やたか」が平年より小玉であった。
- ・「ふじ」を除いた3品種は酸度が低かった。

定期調査一覧表
秋田県果樹試験場(本場)

(令和5年調査終了)

樹種	品種	項目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年	前年
モモ	あかつき 収穫盛期 8月6日 平年差－4日	果重(g)	244.1	－	266.7	－	92%
		縦径(cm)	6.95	－	7.24	－	96%
		横径(cm)	7.71	－	7.84	－	98%
		側径(cm)	7.99	－	8.29	－	96%
		硬度(kg)	1.44	－	1.55	－	93%
		糖度(Brix %)	16.4	－	14.4	－	114%
		pH	4.57	－	4.55	－	100%
	川中島白桃 収穫盛期 9月1日 平年差＋2日	果重(g)	367.4	335.9	352.8	109%	104%
		縦径(cm)	7.88	7.79	7.92	101%	99%
		横径(cm)	8.66	8.51	8.60	102%	101%
		側径(cm)	9.08	8.78	9.08	103%	100%
		硬度(kg)	1.10	1.54	1.25	71%	88%
		糖度(Brix %)	16.6	14.8	11.9	112%	139%
		pH	4.65	4.48	4.37	104%	106%
ブドウ	キャンベル・アーリー 収穫始期 8月18日 平年差－17日	1粒重(g)	6.0	5.8	5.8	104%	103%
		着色(指数)	10.8	10.5	8.5	102%	126%
		糖度(Brix %)	16.1	15.2	14.9	106%	108%
		酒石酸(g/100ml)	0.624	0.541	0.559	115%	112%
	巨峰(無核) 収穫始期 9月1日 平年差－22日	1粒重(g)	11.4	13.4	12.4	85%	92%
		着色(指数)	7.9	7.9	8.0	100%	98%
		糖度(Brix %)	17.9	17.8	16.5	100%	108%
		酒石酸(g/100ml)	0.535	0.527	0.653	101%	82%
	シャインマスカット 収穫始期 9月7日 平年差－13日	1粒重(g)	13.0	12.5	11.6	104%	112%
		果皮色(指数)	3.6	3.9	4.3	93%	84%
		糖度(Brix %)	19.1	18.1	17.8	106%	107%
		酒石酸(g/100ml)	0.228	0.248	0.284	92%	80%

※平年値:モモ「あかつき」は調査樹の変更により、平年値を示さない。

「川中島白桃」は平成25年～令和4年(10か年)の平均値。

ブドウは、平成25年～令和4年(10か年)の平均値。

シャインマスカット果皮色のみ平成30年を除く9か年の平均値。

※ブドウの着色は農林水産省果樹試験場基準果実カラーチャート

「ブドウ紫・黒色系」により判定。

指数は0(無着色)～12(黒色)で、数値が大きいほど着色が濃いことを示す。

※「シャインマスカット」の果皮色は秋田県版シャインマスカット・カラーチャート

により判定。指数は1(緑色)～6(黄色)で、数値が大きいほど黄色が強いことを示す。

定期調査一覧表
秋田県果樹試験場(天王分場)

(令和5年調査終了)

樹種	品種	項目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年	前年
日本ナシ	幸水 収穫期 8月31日 ～9月19日 最終調査日 9月15日	果重(g)	258.5	374.5	375.7	69%	69%
		縦径(cm)	6.59	7.52	7.79	88%	85%
		横径(cm)	7.95	9.15	8.95	87%	89%
		地色(指数)	4.1	3.8	3.7	108%	111%
		硬度(lbs)	5.9	5.8	6.1	102%	97%
		糖度(Brix %)	13.4	12.7	12.7	106%	106%
		リンゴ酸(g/100ml)	0.098	0.076	0.066	129%	148%
	豊水 収穫期 9月15日 ～9月29日 最終調査日 10月2日	果重(g)	401.0	477.8	508.2	84%	79%
		縦径(cm)	7.87	8.62	9.00	91%	87%
		横径(cm)	9.13	9.85	10.54	93%	87%
		地色(指数)	4.0	4.2	4.4	95%	91%
		硬度(lbs)	5.1	5.2	5.4	98%	94%
		糖度(Brix %)	12.8	12.3	12.5	104%	102%
		リンゴ酸(g/100ml)	0.179	0.152	0.128	118%	140%
	あきづき 収穫期 9月22日 ～10月2日 最終調査日 10月2日	果重(g)	283.5	475.6	496.0	60%	57%
		縦径(cm)	7.18	8.27	8.34	87%	86%
		横径(cm)	8.17	9.86	9.70	83%	84%
		地色(指数)	3.7	4.3	4.1	86%	90%
		硬度(lbs)	5.2	4.7	4.5	111%	116%
		糖度(Brix %)	13.7	12.8	12.3	107%	111%
		リンゴ酸(g/100ml)	0.155	0.124	0.111	125%	140%
	秋泉 収穫期 9月29日 ～10月2日 最終調査日 10月2日	果重(g)	558.2	572.5	611.7	98%	91%
		縦径(cm)	9.43	9.60	10.11	98%	93%
		横径(cm)	10.18	10.26	10.40	99%	98%
		地色(指数)	4.4	4.7	4.0	94%	110%
		硬度(lbs)	5.5	5.5	5.6	100%	98%
		糖度(Brix %)	13.6	14.1	12.7	96%	107%
		リンゴ酸(g/100ml)	0.087	0.082	0.074	106%	118%

※平年値 : 平成25年～令和4年(10か年)の平均値。

※「秋泉」のみ散水氷結法を実施。

※「幸水」「あきづき」は、調査数が平年より少ないため参考値とする。

※果実品質調査は、いずれの品種も10果で実施。

※地色は農林水産省果樹試験場基準果実カラーチャート「ニホンナシ(赤ナシ用)地色カラーチャート」により判定。

定期調査一覧表
 かつの果樹センター（旧 鹿角分場）

（令和5年11月15日現在）

樹種	品種	項目	計測値			対比(%)	
			本年	平年	前年	平年	前年
リンゴ	秋田紅あかり 収穫盛期 11月1日 平年差 -3日	果重(g)	357.8	383.3	386.0	93%	93%
		縦径(cm)	8.76	9.08	9.11	96%	96%
		横径(cm)	9.42	9.60	9.57	98%	98%
		硬度(lbs)	13.4	12.9	13.2	104%	102%
		糖度(Brix %)	14.9	14.1	14.6	106%	102%
		酸度(g/100ml)	0.264	0.268	0.266	98%	99%
	王林 収穫盛期 11月1日 平年差 -4日	果重(g)	277.0	330.5	310.4	84%	89%
		縦径(cm)	8.26	8.90	8.49	93%	97%
		横径(cm)	8.30	8.86	8.71	94%	95%
		硬度(lbs)	16.3	15.1	16.0	108%	102%
		糖度(Brix %)	14.4	13.7	14.2	105%	101%
		酸度(g/100ml)	0.293	0.334	0.301	88%	97%
	ふじ 収穫盛期 11月13日 平年差 +1日	果重(g)	342.3	340.8	328.1	100%	104%
		縦径(cm)	8.46	8.51	8.44	99%	100%
		横径(cm)	9.18	9.11	9.09	101%	101%
		硬度(lbs)	16.1	15.9	15.3	101%	105%
		糖度(Brix %)	14.9	13.8	13.6	108%	110%
		酸度(g/100ml)	0.346	0.411	0.366	84%	94%
モモ	あかつき 収穫盛期 8月14日 平年差 -6日	果重(g)	328.5	313.0	312.9	105%	105%
		縦径(cm)	7.75	7.72	7.78	100%	100%
		横径(cm)	8.50	8.35	8.30	102%	102%
		側径(cm)	8.98	8.70	8.84	103%	102%
		硬度(Kg)	1.79	1.91	2.20	94%	81%
		糖度(%)	15.0	13.8	12.3	109%	122%
		酸度(pH)	4.90	4.69	4.58	104%	107%
	川中島白桃 収穫盛期 9月4日 平年差 -3日	果重(g)	430.1	381.2	417.7	113%	103%
		縦径(cm)	8.45	8.26	8.71	102%	97%
		横径(cm)	9.10	8.96	9.05	102%	101%
		側径(cm)	9.75	9.14	9.59	107%	102%
		硬度(kg)	2.10	2.08	2.19	101%	96%
		糖度(Brix%)	15.7	13.4	12.8	117%	123%
		酸度(pH)	4.84	4.51	4.61	107%	105%

※平年値：平成25年～令和4年（10か年）の平均値。