

表 モモの硬核期(2022)

調査地点	品種名	年次	硬核指数		
			0.5(始期)	3.0	4.0(終期)
果樹試験場本場	あかつき	本年	6月18日		
		平年	6月19日	7月7日	7月17日
	川中島白桃	本年	6月22日		
		平年	6月22日	7月9日	7月20日
かづの果樹センター	あかつき	本年	6月21日		
		平年	6月25日	7月18日	-
	川中島白桃	本年	6月24日		
		平年	6月29日	7月20日	-

※1 平年値は平成24年～令和3年の平均値

ただし、本場の「あかつき」は平成28年を除く9か年の平均値、  
「川中島白桃」の終期は令和3年を除く9か年の平均値

果樹試験場本場では、「あかつき」、「川中島白桃」ともに硬核始期はほぼ平年並みとなった。

また、かづの果樹センターの硬核始期は、「あかつき」で平年より4日早く、「川中島白桃」で平年より5日早かった。硬核期中の摘果や新梢管理は生理落果を助長するおそれがあるため、仕上げ摘果は硬核始期(硬核指数0.5)前に終え、修正摘果は硬核期が終わる少し前(硬核指数3.0)から始める。

また、結果樹での新梢管理は硬核期間中(硬核指数0.5～3.0)は控える。