

| 表 モモの硬核期(2023) |       |    | 令和5年7月10日現在 |       |         |
|----------------|-------|----|-------------|-------|---------|
| 調査地点           | 品種名   | 年次 | 硬核指数        |       |         |
|                |       |    | 0.5(始期)     | 3.0   | 4.0(終期) |
| 果樹試験場本場        | あかつき  | 本年 | 6月13日       | 6月29日 | 7月8日    |
|                |       | 平年 | 6月18日       | 7月6日  | 7月16日   |
|                | 川中島白桃 | 本年 | 6月15日       | 6月30日 | 7月10日   |
|                |       | 平年 | 6月21日       | 7月8日  | 7月19日   |
| かづの果樹センター      | あかつき  | 本年 | 6月16日       | 7月5日  |         |
|                |       | 平年 | 6月24日       | 7月16日 | －       |
|                | 川中島白桃 | 本年 | 6月20日       | 7月6日  |         |
|                |       | 平年 | 6月28日       | 7月18日 | －       |

※1 平年値は平成25年～令和4年の平均値  
ただし、本場の「あかつき」は平成28年を除く9か年の平均値、  
「川中島白桃」の終期は令和3年を除く9か年の平均値

果樹試験場本場では、「あかつき」は平年より8日早く、「川中島白桃」は平年より10日早く硬核期が終了した。  
また、かづの果樹センターの「あかつき」は平年より11日早く、「川中島白桃」は平年より12日早く硬核指数3.0に達した。  
県南、県北ともすでに硬核指数3.0を過ぎたら、生理落果のおそれが少なくなるため、修正摘果や新梢管理を進める。