

平成27年12月15日  
秋田県がん対策室

## I 概要

### 1. 背景

秋田県では、2006年から地域がん登録事業を開始し、(公財)秋田県総合保健事業団に委託して、毎年がん登録を実施している。この度、事業開始から5年以上が経ち、登録データが蓄積されたため、以下に示す方法で、秋田県全体の5年相対生存率を算出した。

### 2. 5年相対生存率とは

あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標。あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体\*で5年後に生存している人を100%としたとき何%になるかで表す。100%に近いほど治療で生命を救えるがん、0%に近いほど治療で生命を救い難いがんであることを意味する。

\* 正確には、性別、出生年、および年齢の分布を同じくする日本人集団。

### 3. 5年相対生存率の算出対象

2006(平成18)年1月1日から2008(平成20)年12月31日までの期間にがんと診断された症例のうち、次のアからオを除くものを生存率の集計対象とした。

- (ア) 死亡情報のみで登録された患者(DCO)
- (イ) 多重がんのあるケースでは第2がん以降
- (ウ) 年齢不詳および100歳以上の症例
- (エ) がん死亡情報からの遡り調査による登録
- (オ) 上皮内がん(大腸粘膜がんを含む。)

### 4. 5年相対生存率の算出方法

- (1) 診断日を起点とした実測生存率を、Kaplan-Meier法を用いて計算した。住民票照会を実施していないため、死亡情報がなかった症例は、全員5年生存とみなしている。
- (2) 対象がんによる生命損失の大きさをみるために、実測生存率を、対象とするがん患者と同じ性、年齢、出生年の一般集団の生存確率から計算した期待生存率で除した相対生存率を計測した。
- (3) 期待生存率は、0.5歳分加算したコホート生存率表に基づき、Ederer II法を用いて計算した。期待生存率は、国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報・統計部が、簡易生命表を用いて毎年計算しているコホート生存率表を用いた。(http://ganjoho.jp/professional/statistics/cohort01.html)

### 5. データの取り扱いについての留意点

- 住民票照会を実施していないため、死亡の把握漏れによって「生存」に含まれる死亡者がいる可能性がある。
- 部位によっては、症例数が少ないため標準誤差が大きく、精度が低い。
- 他県で公表している5年相対生存率と比較する際は、算出対象や算出方法が異なることが多いため、単純に比べることができないので、注意が必要である。

## II 結果

### 1-1 主要部位別 5年相対生存率（2006～2008年診断症例）

		対象者数 (人)	生存数 (人)	死亡数 (人)	実測生存率		期待生存率 (%)	相対生存率	
					(%)	標準誤差		(%)	標準誤差
全部位	男女計	21,926	11,691	10,235	53.3	0.3	85.5	62.3	0.4
	男	13,147	6,622	6,525	50.4	0.4	82.4	61.1	0.5
	女	8,779	5,069	3,710	57.7	0.5	90.1	64.1	0.6
胃	男女計	4,885	2,760	2,125	56.5	0.7	84.4	66.9	0.8
	男	3,337	1,900	1,437	56.9	0.9	83.1	68.5	1.0
	女	1,548	860	688	55.6	1.3	87.4	63.5	1.4
大腸 (結腸・直腸)	男女計	3,859	2,235	1,624	57.9	0.8	85.2	68.0	0.9
	男	2,242	1,278	964	57.0	1.0	83.2	68.5	1.3
	女	1,617	957	660	59.2	1.2	88.1	67.2	1.4
結腸	男女計	2,597	1,534	1,063	59.1	1.0	84.2	70.1	1.1
	男	1,404	828	573	59.1	1.3	81.8	72.2	1.6
	女	1,196	706	490	59.0	1.4	87.2	67.7	1.6
直腸	男女計	1,262	701	561	55.6	1.4	87.3	63.6	1.6
	男	841	450	391	53.5	1.7	85.7	62.4	2.0
	女	421	251	170	59.6	2.4	90.4	65.9	2.6
肝及び 肝内胆管	男女計	723	195	528	27.0	1.7	85.2	31.7	1.9
	男	483	136	347	28.2	2.0	84.3	33.4	2.4
	女	240	59	181	24.6	2.8	87.1	28.2	3.2
肺	男女計	2,213	602	1,611	27.2	0.9	84.0	32.4	1.1
	男	1,555	349	1,206	22.4	1.1	81.1	27.7	1.3
	女	658	253	405	38.4	1.9	89.1	43.1	2.1
乳房	女	1,496	1,255	241	83.9	1.0	94.6	88.7	1.0
子宮	女	442	314	128	71.0	2.2	94.7	75.0	2.3
前立腺	男	1,757	1,378	379	78.4	1.0	80.5	96.7	1.2

### 1-2 部位別 5年相対生存率（2006～2008年診断症例）

	男女計			男			女		
	対象者数	相対生存率 (%)	標準誤差	対象者数	相対生存率 (%)	標準誤差	対象者数	相対生存率 (%)	標準誤差
全部位	21,926	62.3	0.4	13,147	61.1	0.5	8,779	64.1	0.6
口腔・咽頭	393	55.1	2.9	283	53.6	3.4	110	58.7	5.3
食道	718	45.3	2.1	625	44.4	2.3	93	51.7	5.9
胃	4,885	66.9	0.8	3,337	68.5	1.0	1,548	63.5	1.4
大腸(結腸・直腸)	3,859	68.0	0.9	2,242	68.5	1.3	1,617	67.2	1.4
結腸	2,597	70.1	1.1	1,401	72.2	1.6	1,196	67.7	1.6
直腸	1,262	63.6	1.6	841	62.4	2.0	421	65.9	2.6
肝および肝内胆管	723	31.5	1.9	483	33.4	2.4	239	27.9	3.2
胆のう・胆管	682	25.0	1.9	356	24.9	2.7	326	25.0	2.6
膵臓	781	9.6	1.2	431	8.9	1.6	350	9.9	1.7
喉頭	134	79.5	5.0	127	79.4	5.1	7	75.1	20.1
肺	2,213	32.4	1.1	1,555	27.7	1.3	658	43.1	2.1
皮膚	396	93.7	3.0	200	88.4	4.5	196	95.6	4.1
乳房	1,505	88.7	1.0	9	84.1	17.5	1,496	88.7	1.0
子宮	-	-	-	-	-	-	442	75.0	2.3
子宮頸	-	-	-	-	-	-	179	69.3	3.8
子宮体	-	-	-	-	-	-	257	79.8	2.8
卵巣	-	-	-	-	-	-	149	60.9	3.3
前立腺	-	-	-	1,757	96.7	1.2	-	-	-
膀胱	553	72.5	2.7	406	72.8	3.2	147	69.2	4.8
腎・尿路	320	62.8	2.5	216	63.4	3.1	104	61.5	4.5
脳・中枢神経系	248	64.0	3.5	113	66.3	5.3	135	62.0	4.6
甲状腺	348	93.8	1.7	56	81.0	5.8	292	95.9	1.5
悪性リンパ腫	502	61.0	2.5	271	59.2	3.6	231	63.2	3.5
多発性骨髄腫	109	33.7	5.1	56	39.4	7.7	53	27.9	6.7
白血病	184	42.0	3.9	106	38.8	5.1	78	46.3	6.0

○ 2006～2008年診断の全部位男女計の5年相対生存率は、62.3%となった。これは、比較年が異なるが、国立がん研究センターがん対策情報センターが公表している全国推計の5年相対生存率(※)の58.6%を上回っている。


※ 国立がん研究センターがん対策情報センター「全国がん罹患モニタリング集計 2003-2005年生存率報告」  
(ウェブページ: <http://ganjoho.jp/professional/statistics/monita.html>)

- 全部位において男性が61.1%、女性が64.1%であり、女性の5年生存率の方が約3%高い。
- 部位別に見ると、男性の5年相対生存率が比較的高い群(70～100%)には、結腸、喉頭、皮膚、乳房、前立腺、膀胱、甲状腺が分類された。中程度の群(40～69%)には、口腔・咽頭、食道、胃、直腸、腎・尿路、脳・中枢神経系、悪性リンパ腫が含まれた。生存率が低い群(0～39%)には、肝および肝内胆管、胆のう・胆管、膵臓、肺、多発性骨髄腫、白血病が含まれた。
- 女性の5年相対生存率において、比較的高い群(70～100%)には、喉頭、皮膚、乳房、子宮体部、甲状腺が分類された。中程度の群(40～69%)には、口腔・咽頭、食道、胃、結腸、直腸、肺、子宮頸部、卵巣、膀胱、腎・尿路、脳・中枢神経系、悪性リンパ腫、白血病が含まれた。生存率が低い群(0～39%)には、肝および肝内胆管、胆のう・胆管、膵臓、多発性骨髄腫が含まれた。

## 2 発見経緯別 5年相対生存率 (2006～2008年診断症例)

※割検発見を除いているため、対象者数の合計が、1-2に示す対象者数と合わない

		がん検診			健診・人間ドック			他疾患の経過観察中			症状受診・その他・不明		
		対象者数	相対生存率	標準誤差	対象者数	相対生存率	標準誤差	対象者数	相対生存率	標準誤差	対象者数	相対生存率	標準誤差
全部位	男女計	1,838	96.5	0.9	1,504	87.9	1.1	5,017	61.7	0.9	13,545	55.0	0.5
	男	1,186	99.2	1.2	1,019	86.6	1.5	3,286	62.2	1.1	7,645	51.2	0.7
	女	652	91.2	1.4	485	90.4	1.7	1,731	60.8	1.4	5,900	59.8	0.7
胃	男女計	402	96.1	2.1	465	95.2	1.7	1,218	72.1	1.7	2,799	55.2	1.1
	男	294	96.8	2.5	354	95.6	2.0	854	74.0	2.1	1,834	55.5	1.4
	女	108	93.3	3.5	111	92.9	3.3	364	67.7	3.1	965	54.8	1.9
大腸 (結腸・直腸)	男女計	380	98.6	2.0	267	93.6	2.2	779	69.7	2.2	2,430	59.5	1.2
	男	213	98.5	2.9	163	94.1	3.0	478	73.6	2.8	1,386	58.5	1.6
	女	167	95.9	2.7	104	92.6	3.3	301	63.1	3.4	1,044	60.7	1.8
肺	男女計	117	63.7	5.3	236	62.1	3.7	696	35.0	2.1	1,163	21.5	1.3
	男	72	64.8	6.8	157	53.2	4.7	498	29.1	2.4	827	18.6	1.5
	女	45	62.1	8.3	79	78.9	5.3	198	49.3	4.0	336	28.4	2.7
乳房	女	182	97.1	1.7	72	95.9	2.8	142	85.8	3.6	1,099	87.0	1.2
子宮	女	50	89.3	4.7	12	100.0	0.0	42	75.3	7.4	338	71.6	2.7
前立腺	男	545	100.0	1.5	170	96.3	2.8	385	94.8	2.9	654	88.7	2.3




- 発見経緯別に見ると、5年相対生存率の高い順は、「がん検診」及び「健診・人間ドック」、「他疾患の経過観察中」、「症状受診・その他・不明」となっている。
- 「がん検診」及び「健診・人間ドック」の生存率はほとんどの部位で90%を超え、特に胃、大腸、肺は、それ以外との比較で、20%以上の差がある。
- 「がん検診」及び「健診・人間ドック」の5年相対生存率から、これらによる早期発見・早期治療が高い生存率に結びついていると考えられる。

### 3 臨床進行度別 5年相対生存率（2006～2008年診断症例）

※上皮内、不明を除いているため、対象者数の合計が、1-1に示す対象者数と合わない

		限局			リンパ節			浸潤			遠隔		
		対象者数	相対生存率	標準誤差	対象者数	相対生存率	標準誤差	対象者数	相対生存率	標準誤差	対象者数	相対生存率	標準誤差
全部位	男女計	9,226	91.8	0.5	2,363	65.4	1.1	2,865	42.4	1.0	3,556	18.7	0.7
	男	5,662	91.5	0.7	1,245	57.4	1.7	1,715	41.8	1.4	2,224	18.0	0.9
	女	3,564	92.2	0.7	1,118	73.9	1.5	1,150	43.3	1.6	1,332	19.9	1.2
胃	男女計	2,434	97.1	0.9	645	60.1	2.3	484	27.0	2.3	645	11.6	1.4
	男	1,731	97.8	1.1	432	58.6	2.8	321	28.0	2.8	441	13.2	1.8
	女	703	95.4	1.5	213	62.8	3.8	163	25.1	3.8	204	8.3	2.1
大腸 (結腸・直腸)	男女計	1,497	94.2	1.2	692	73.3	2.1	341	50.5	3.2	802	30.5	1.8
	男	926	93.9	1.6	393	71.5	3.0	173	52.1	4.4	457	29.9	2.4
	女	571	93.7	1.7	299	75.6	3.1	168	48.8	4.6	345	31.1	2.7
結腸	男女計	1,000	95.0	1.5	462	78.1	2.6	238	55.0	3.9	546	32.8	2.2
	男	580	95.3	2.1	246	79.4	3.7	107	56.0	5.7	285	34.5	3.2
	女	420	93.6	2.1	216	76.6	3.6	131	54.1	5.3	261	30.9	3.1
直腸	男女計	497	92.6	2.0	230	64.1	3.7	103	40.3	5.4	256	25.6	3.0
	男	346	91.4	2.6	147	58.7	4.7	66	44.6	7.0	172	22.4	3.5
	女	151	94.2	2.9	83	73.1	5.6	37	30.6	8.3	84	32.0	5.5
肝及び 肝内胆管	男女計	343	49.2	3.1	18	23.7	11.1	132	15.6	3.5	78	1.4	1.4
	男	236	51.7	3.8	12	25.5	14.0	92	16.1	4.3	55	2.0	2.0
	女	107	43.9	5.3	6	17.7	17.8	40	14.7	6.1	23	0.0	0.0
肺	男女計	583	78.0	2.3	225	30.4	3.4	277	19.5	2.7	724	8.7	1.1
	男	367	69.8	3.2	166	28.3	4.0	209	16.3	2.9	523	8.5	1.3
	女	216	90.7	2.8	59	35.7	6.7	68	28.9	6.1	201	9.2	2.2
乳房	女	870	97.4	1.0	365	89.8	1.9	84	64.6	6.0	83	36.6	5.6
子宮	女	211	93.3	2.2	31	43.8	9.3	105	69.9	5.0	34	18.3	6.8
前立腺	男	1,067	100.0	1.3	31	87.7	9.4	259	97.7	2.8	165	47.9	4.8



○ 臨床進行度別に見ると、全部位において、限局が91.8%、リンパ節が65.4%、浸潤が42.4%、遠隔が18.7%であった。臨床進行度が高くなるにつれ、生存率が低くなることを示している。