感染性胃腸炎集団発生の疑いについて

施設名:

電話 :

↓嘔吐・下痢症状がある者を全て計上してください(他疾患の診断がついた者を除く)

	氏名(年齢)	利用者·職員	症状発症日	受診日		/ (/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	備考
			月 日	月	日													
1	ı		嘔吐・下痢・発熱	診断()													
				検査∶有∙無	無()													
			月 日	月	日													
2	2		嘔吐・下痢・発熱	診断()													
				検査∶有∙無	無()													
			月 日	月	日													
3	3		嘔吐•下痢•発熱	診断()													
				検査∶有∙無	無()													
			月 日	月	日													
4	1		嘔吐•下痢•発熱	診断()													
				検査∶有∙無	無()													
			月 日	月	日													
5	5		嘔吐•下痢•発熱	診断()													
				検査∶有∙無	無()													
			月 日	月	日													
6	3		嘔吐•下痢•発熱	診断()													
				検査∶有∙無	無()													
			月 日	月	日													
7	7		嘔吐•下痢•発熱	診断()													
				検査∶有∙無	無()													
			月 日	月	日													
8	3		嘔吐•下痢•発熱)													
			+	検査∶有∙無	無()													
			月日		日													
9			嘔吐•下痢•発熱)													
				検査∶有∙無														
			月日		日													
10			嘔吐•下痢•発熱)													
				検査∶有∙無	無()													

[※]発症日:症状が現れ始めた日 ※潜伏期間:【ノロウイルス】12~48時間、【ロタウイルス】1~3日 ※感染可能期間:下痢症状がなくなっても、通常では一週間程度、長いときには1か月程度便中にウイルスが排出される可能性あり ※環境下でのウイルス生存期間:【ノロウイルス(ネコカリシウイルスでの代用研究より)】乾燥状態(室温)で21~28日、冷蔵食品の表面で10日、カーペットで12日、水中で2か月以上 (凍結状態から60℃まで生存可能) ※療養解除の目安:嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること

[※]発症日以前の施設利用状況についてもご記載願います。