

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)集団発生の疑いについて

施設名 : _____

電話 : _____

↓次の症状がある者を計上してください(他疾患の診断がついた者を除く)

氏名(年齢)	利用者・職員	症状発症日	受診日	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	備考
1		月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 診断() 検査:有(+/-)・無													
2		月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 診断() 検査:有(+/-)・無													
3		月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 診断() 検査:有(+/-)・無													
4		月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 診断() 検査:有(+/-)・無													
5		月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 診断() 検査:有(+/-)・無													
6		月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 診断() 検査:有(+/-)・無													
7		月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 診断() 検査:有(+/-)・無													
8		月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 診断() 検査:有(+/-)・無													
9		月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 診断() 検査:有(+/-)・無													
10		月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 診断() 検査:有(+/-)・無													

※発症日:症状が現れ始めた日(発熱は37.5℃を目安としてください)
 ※潜伏期間:1~14日(オミクロン株:7日以内で多くは2~3日)
 ※感染可能期間:発症2日前から発症後~10日間は鼻やのどからウイルスが排出される(特に発症後5日間は他人に感染させるリスクが高い)
 ※環境下でのウイルス生存期間:プラスチック表面で最大72時間、ボール紙で最大24時間
 ※学校保健安全法における出席停止期間:【有症状】発症日を0日目とし、5日を経過し、かつ、症状が軽快(解熱剤を使用せず解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること)した後1日(24時間)を経過するまで
 【無症状】検体を採取した日から5日を経過するまで
 ※発症後5日間は外出を控えること、発症後10日間はマスク着用・ハイリスク者との接触を控えることが推奨される
 ※発症日以前の施設利用状況についてもご記載願います