

インフルエンザ様疾患集団発生の疑いについて

施設名：

電話：

↓発熱があり、かつ、インフルエンザ様症状の者を全て計上してください（他疾患の診断がついた者を除く）。

	イニシャル等(年齢)	利用者・職員等	クラス・居室等	症状発症日	受診日	特記事項	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	備考
1				月 日 発熱・咳・くしゃみ 咽頭痛・鼻汁	月 日 検査：A・B・無													
2				月 日 発熱・咳・くしゃみ 咽頭痛・鼻汁	月 日 検査：A・B・無													
3				月 日 発熱・咳・くしゃみ 咽頭痛・鼻汁	月 日 検査：A・B・無													
4				月 日 発熱・咳・くしゃみ 咽頭痛・鼻汁	月 日 検査：A・B・無													
5				月 日 発熱・咳・くしゃみ 咽頭痛・鼻汁	月 日 検査：A・B・無													
6				月 日 発熱・咳・くしゃみ 咽頭痛・鼻汁	月 日 検査：A・B・無													
7				月 日 発熱・咳・くしゃみ 咽頭痛・鼻汁	月 日 検査：A・B・無													
8				月 日 発熱・咳・くしゃみ 咽頭痛・鼻汁	月 日 検査：A・B・無													
9				月 日 発熱・咳・くしゃみ 咽頭痛・鼻汁	月 日 検査：A・B・無													
10				月 日 発熱・咳・くしゃみ 咽頭痛・鼻汁	月 日 検査：A・B・無													

※発症日：症状が現れ始めた日（発熱は37. 5℃を目安としてください）
※インフルエンザ潜伏期間：1～3日
※インフルエンザ感染可能期間：発症前日から発症後3～7日間は鼻やのどからウイルスが排出される
※環境下でのウイルス生存期間：1～2日（湿度を50%以上にすると、生存率が低下する）
※学校保健安全法における出席停止期間：発症日を0日目とし、5日を経過し、かつ、解熱した日を0日目とし2日（幼児にあっては3日）経過するまで
※発症日以前の施設利用状況についてもご記載願います