

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 集団発生の疑いについて 施設名： 電話：

↓次の症状がある者を計上してください（他疾患の診断がついた者を除く）。

	イニシャル等(年齢)	利用者・職員等	クラス・居室等	症状発症日	受診日	特記事項	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	備考
1				月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 検査:有(+/-)・無													
2				月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 検査:有(+/-)・無													
3				月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 検査:有(+/-)・無													
4				月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 検査:有(+/-)・無													
5				月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 検査:有(+/-)・無													
6				月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 検査:有(+/-)・無													
7				月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 検査:有(+/-)・無													
8				月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 検査:有(+/-)・無													
9				月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 検査:有(+/-)・無													
10				月 日 発熱・咳・咽頭痛・鼻汁 頭痛・倦怠感・嘔吐	月 日 検査:有(+/-)・無													

※発症日:症状が現れ始めた日(発熱は37. 5℃を目安としてください)
※潜伏期間:1～14日(オミクロン株:7日以内で多くは2～3日)
※感染可能期間:発症2日前から発症後～10日間は鼻やのどからウイルスが排出される(特に発症後5日間は他人に感染させるリスクが高い)
※環境下でのウイルス生存期間:プラスチック表面で最大72時間、ボール紙で最大24時間
※学校保健安全法における出席停止期間:【有症状】発症日を0日目とし、5日を経過し、かつ、症状が軽快(解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること)した後1日(24時間)を経過するまで
【無症状】検体を採取した日から5日を経過するまで
※発症後5日間は外出を控えること、発症後10日間はマスク着用・ハイリスク者との接触を控えることが推奨される
※発症日以前の施設利用状況についてもご記載願います