

インフルエンザ様疾患集団発生の疑いについて

施設名：

電話：

↓発熱があり、かつ、インフルエンザ様症状の者を全て計上してください（他疾患の診断がついた者を除く）。

	イニシャル等(年齢)	利用者・職員等	クラス・居室等	症状発症日	受診日	特記事項	4/20(月)	4/21(火)	4/22(水)	4/23(木)	4/24(金)	4/25(土)	4/26(日)	4/27(月)	4/28(火)	4/29(水)	4/30(木)	5/1(金)	備考
1	A・T(70)	利用者	101号室	4月20日 発熱・咽頭痛	4月21日 検査:A(+)		38.5℃ 受診 インフルA(+) タミフル内服	①	②	③ 解熱36℃台	④	⑤	隔離終了 症状なし						
2	A・J(80)	利用者	101号室	4月21日 発熱・咳・咽頭痛	4月22日 検査:A(+)	No.1と同室		38.5℃ 受診 インフルA(+) タミフル内服	①	②	③ 解熱36℃台	④	⑤	隔離終了 症状なし					
3	A・H(40)	介護職員	101号室	4月21日 発熱・咳・咽頭痛	4月22日 検査:A(+)	No.1・2の担当		38.5℃ 受診 インフルA(+) タミフル内服	欠①	欠② 解熱36℃台	欠③	欠④	欠⑤	出勤 症状なし					
4	S・H(2)	園児	2歳児組	4月22日 発熱・咳・咽頭痛	4月23日 検査:A(+)	No.5の兄弟			38.5℃ 早退・受診 インフルA(+) タミフル内服	欠①	欠② 解熱36℃台	欠③	欠④	欠⑤	登園 症状なし				
5	S・H(4)	園児	4歳児組	4月22日 発熱・咳・咽頭痛	4月23日 検査:A(+)	No.4の兄弟			38.5℃ 早退・受診 インフルA(+) タミフル内服	欠①	欠② 解熱36℃台	欠③	欠④	欠⑤	登園 症状なし				
6	A・H(30)	保育士	4歳児組	4月24日 発熱・咳・咽頭痛	4月25日 検査:A(+)	No.5の担任					夜39.5℃	受診 インフルA(+) タミフル内服 欠①	欠② 解熱36℃台	欠③	欠④	欠⑤	出勤 症状なし		
7				月　　日 発熱・咳・くしゃみ 咽頭痛・鼻汁	月　　日 検査:A・B・無														
8				月　　日 発熱・咳・くしゃみ 咽頭痛・鼻汁	月　　日 検査:A・B・無														
9				月　　日 発熱・咳・くしゃみ 咽頭痛・鼻汁	月　　日 検査:A・B・無														
10				月　　日 発熱・咳・くしゃみ 咽頭痛・鼻汁	月　　日 検査:A・B・無														

※発症日:症状が現れ始めた日(発熱は37. 5℃を目安としてください)
※インフルエンザ潜伏期間:1～3日
※インフルエンザ感染可能期間:発症前日から発症後3～7日間は鼻やのどからウイルスが排出される
※環境下でのウイルス生存期間:1～2日(湿度を50%以上にすると、生存率が低下する)
※学校保健安全法における出席停止期間:発症日を0日目とし、5日を経過し、かつ、解熱した日を0日目とし2日(幼児にあっては3日)経過するまで
※発症日以前の施設利用状況についてもご記載願います