

感染性胃腸炎集団発生の疑いについて

施設名 :

電話 :

↓次の症状がある者を全て計上してください(他疾患の診断がついた者を除く)

氏名(年齢)	利用者・職員	症状発症日	受診日	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	/ ()	備考
1		月 日 嘔吐・下痢・発熱	月 日 診断() 検査:有・無()												
2		月 日 嘔吐・下痢・発熱	月 日 診断() 検査:有・無()												
3		月 日 嘔吐・下痢・発熱	月 日 診断() 検査:有・無()												
4		月 日 嘔吐・下痢・発熱	月 日 診断() 検査:有・無()												
5		月 日 嘔吐・下痢・発熱	月 日 診断() 検査:有・無()												
6		月 日 嘔吐・下痢・発熱	月 日 診断() 検査:有・無()												
7		月 日 嘔吐・下痢・発熱	月 日 診断() 検査:有・無()												
8		月 日 嘔吐・下痢・発熱	月 日 診断() 検査:有・無()												
9		月 日 嘔吐・下痢・発熱	月 日 診断() 検査:有・無()												
10		月 日 嘔吐・下痢・発熱	月 日 診断() 検査:有・無()												

※発症日:症状が現れ始めた日
 ※潜伏期間:ノロウイルス12~48時間、ロタウイルス1~3日
 ※感染可能期間:下痢症状がなくなっても、通常では一週間程度、長いときには1か月程度便中にウイルスが排出される可能性あり
 ※療養解除の目安:嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること
 ※発症日以前の施設利用状況についてもご記載願います。