

令和5年度 農作物病害虫発生予察情報 発生予報 第2号（6月予報）

令和5年5月30日 秋田県病害虫防除所

【内容】 Ⅰ. 予報の要点 Ⅱ. 主要病害虫の向こう1か月の予報 Ⅲ. 発生予報と防除対策 Ⅳ. 気象予報 Ⅴ. 気象データ Ⅵ. 用語の説明	【問合せ先】 秋田県病害虫防除所 018-881-3660 秋田県農業試験場 018-881-3326 秋田県果樹試験場 0182-25-4224 かづの果樹センター 0186-25-3231 天王分場班 018-878-2251
【お知らせ】 ◇今回の予報対象期間は6月を主とします。次回の発表は令和5年6月27日の予定です。 ◇病害虫発生予察情報は秋田県病害虫防除所のウェブサイトでご覧いただけます。 https://www.pref.akita.lg.jp/bojo/ ◇短期暴露評価により使用方法が変更された農薬の情報については、秋田県のウェブサイトでご確認ください。 https://www.pref.akita.lg.jp/suiden/ ◇農薬の登録内容は随時更新されますので、防除薬剤については指導機関にご相談ください。 最新の農薬登録状況は、農林水産省ウェブサイト「農薬登録情報提供システム」でご確認ください。 https://pesticide.maff.go.jp/ ◇病害虫発生予察情報の発表をお知らせするメールマガジンはこちらのウェブサイトでご登録いただけます。 https://www.e-komachi.jp/	

I. 予報の要点

水 稲	葉いもちの感染量はやや多いと予想されます。余り苗は直ちに処分してください。また、水面施用剤（オリゼメート粒剤、ルーチン粒剤）を使用する場合は、移植栽培では6月15日頃、直播栽培では6月23日頃に散布してください。 斑点米カメムシ類（第1世代）の発生時期は早いと予想されます。6月上旬から農道・畦畔や休耕田等の除草を地域でまとまって行ってください。
畑作物	小麦では、赤かび病の発生量がやや少ないと予想されますが、1回目（開花始期）の防除を行っていない場合は、直ちに防除してください。 大豆では、ネキリムシ類の発生量が平年並と予想されます。播種前にはほ場内やほ場周辺の雑草処理を行うほか、例年被害が見られるほ場では、クルーザーMAX等により防除を行ってください。
野 菜	ねぎでは、べと病の発生量がやや多いと予想されます。予防に努めるとともに発病が見られたら治療効果のある薬剤で防除してください。 キャベツの病害では、菌核病の発生量が多い、害虫では、コナガ、ヨトウガの発生量がやや多いと予想されますので薬剤防除を徹底しましょう。
花 き	りんどうの病害では、葉枯病の発生量が多いと予想されます。過剰な追肥を控えて過繁茂を避け、薬剤で防除を行ってください。害虫ではハダニ類の発生量がやや多いと予想されます。発生初期から薬剤で防除を行ってください。
果 樹	りんごとなしで果樹カメムシ類の発生が多いと予想されます。飛来状況を観察し、園内へ飛来が多い場合はネオニコチノイド剤等を散布してください。

Ⅱ. 主要病害虫の向こう1か月の予報

作目名	病害虫名	対象地域	発生時期 感染時期	発生量・感染量	
				現況	予報
水 稲	葉いもち (全般発生開始期)	全県	平年並	—	やや多い
	ばか苗病	全県	—	やや少ない	やや少ない
	イネミズゾウムシ	全県	早い	多い	多い
	イネドロオイムシ	全県	やや早い	—	平年並
	イネミギワバエ(第2世代) (イネヒメハモグリバエ)	全県	早い	やや多い	やや多い
	斑点米カメムシ類(第1世代)				
	アカスジカスミカメ	全県	早い	—	やや少ない
	アカヒゲホソミドリカスミカメ	全県	早い	—	やや多い
フタオビコヤガ(第1世代) (イネアオムシ)	全県	平年並	平年並	平年並	
小 麦	赤かび病	全県	早い	—	やや少ない
	うどんこ病	全県	—	—	やや多い
大 豆	ネキリムシ類	全県	—	平年並	平年並
	食葉性鱗翅目幼虫	全県	—	—	平年並
ね ぎ	べと病	全県	—	平年並	やや多い
きゅうり	黒星病	全県	—	—	やや少ない
キャベツ (初夏どり)	菌核病	全県	やや早い	平年並	多い
	コナガ	全県	—	やや少ない	やや多い
	モンシロチョウ	全県	—	やや少ない	平年並
	ヨトウガ(第1世代)	全県	平年並	平年並	やや多い
えだまめ	ネキリムシ類	全県	—	平年並	平年並
	食葉性鱗翅目幼虫	全県	—	—	平年並
りんどう	葉枯病	全県	—	多い	多い
	リンドウホソハマキ	全県	早い	やや少ない	平年並
	ハダニ類	全県	やや早い	平年並	やや多い

作目名	病害虫名	対象地域	発生時期 感染時期	発生量・感染量	
				現況	予報
りんご	斑点落葉病	全県	早い	—	やや少ない
	モニリア病 (実(株)ぐされ)	全県	—	やや少ない	やや少ない
	黒星病	県北部	—	やや多い	やや多い
		県中央部・県南部	—	平年並	平年並
	炭疽病	全県	早い	—	平年並
	輪紋病	全県	早い	—	平年並
	シンクイムシ類 (モモシンクイガ)	全県	早い	—	やや少ない
	ナミハダニ	全県	—	多い	多い
	ハマキムシ類(第1世代) (リンゴコカクモンハマキ) (リンゴモンハマキ)	全県	平年並	やや少ない	やや少ない
	果樹カメムシ類 (クサギカメムシ) (チャバネアオカメムシ)	全県	—	多い	多い
キンモンホソガ (第2世代)	全県	—	—	やや少ない	
なし (日本なし)	黒星病	県北部・県中央部	—	平年並	やや多い
	黒斑病	県北部・県中央部	—	平年並	平年並
	輪紋病	県北部・県中央部	—	—	平年並
	シンクイムシ類 (モモシンクイガ)	県北部・県中央部	早い	—	平年並
	ナミハダニ	県北部・県中央部	—	平年並	平年並
	ハマキムシ類	県北部・県中央部	—	多い	多い
	果樹カメムシ類 (クサギカメムシ) (チャバネアオカメムシ)	県北部・県中央部	—	多い	多い
ぶどう	べと病	県南部	—	—	やや少ない
	芽枯病	県南部	早い	やや多い	やや多い
	灰色かび病	県南部	—	平年並	平年並
	晩腐病(花蕾発病)	県南部	—	—	平年並
	チャノキイロアザミウマ	県南部	平年並	—	平年並
飼料作物	アワヨトウ(第1世代)	全県	早い	やや多い	やや多い

Ⅲ. 発生予報と防除対策

A 水稲

病虫害名	予報内容	
	感染時期	感染量
1. 葉いもち (全般発生開始期)	平年並 (前年並)	やや多い (-)

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の気温は平年並か高い、降水量は平年並か多いと予報されている(±/±)。

イ、育苗期巡回調査における苗いもちの発病箱率、発病地点率はいずれも0%(平年0%)で平年並だった(/±)が、稲わら及び籾殻の確認地点率は育苗施設内では3.5%(平年0.8%)で高く、育苗施設周辺を含めた確認地点率は3.5%(平年3.5%)で平年並だった(/+)。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、余り苗は、直ちに泥に埋めて処分する。

イ、ベンレート水和剤又はビームゾルによる育苗期のいもち病防除をしなかった場合、いもち病の持ち込みや早期に伝染する可能性があるため、余り苗や本田をよく観察して発病の有無を確認する。

ウ、乾燥状態で保管された稲わらや籾殻は本病の伝染源となるので、これらを使用した野菜ほ場の周辺では葉いもちが早期に発病していないか確認する。

エ、葉いもち防除として箱施用剤や側条施用剤を使用しなかった場合は、オリゼメート粒剤を10a当たり2kg、又はルーチン粒剤を10a当たり1kgを散布する。散布時期は、移植栽培では6月15日頃(6月12~18日)、直播栽培では6月23日頃(20~25日)である。

オ、箱施用剤又は側条施用剤を使用していないほ場では、感染苗の持ち込み等により早期に本田で発病することがある。6月15日までに発病を確認した場合は、直ちにオリゼメート粒剤又はルーチン粒剤を散布し、その15~20日後にも同剤を散布する。6月15日以降に発病を確認した場合は、オリゼメート粒剤又はルーチン粒剤の散布に加え、予防剤と治療剤の混合剤(ブラシン剤又はノンプラス剤)の茎葉散布を行う。その後、必要に応じてビーム剤を追加散布する。

病虫害名	予報内容	
	発生時期	発生量
2. ばか苗病	-	やや少ない(前年よりやや少ない)

(1) 予報の根拠

ア、育苗期巡回調査における発病箱率は1.0%(平年2.1%)、発病地点率は7.0%(平年13.0%)でいずれもやや低かった(/-)。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、採種ほ周辺のほ場で発病茎を見つけたときは、株ごと抜き取り、泥に埋めて処分する。

病虫害名	予報内容	
	発生時期	発生量
3. イネミズゾウムシ	早い(前年並)	多い(前年より多い)

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の気温は平年並か高いと予報されている(±/±)。

イ、有効積算温度計算シミュレーション（J P P - N E T、気象観測地点：秋田）による越冬後成虫の侵入盛期は5月31日（平年6月7日）、密度盛期は6月4日（平年6月11日）と予想される（- / ）。

ウ、5月1～4半旬の予察灯（6地点）における越冬後成虫の総誘殺数は26頭（平年3.3頭）が多かった（ / + ）。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、6月上旬に越冬後成虫が1株当たり0.3頭（食害株率90%以上に相当）以上の場合は、トレボン粒剤で防除する。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
4. イネドロオイムシ	やや早い（-）	平年並（前年並）

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の気温は平年並か高いと予報されている（- / ）。

イ、前年の発生量から、越冬量は平年並と推定される（ / ± ）。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、産卵盛期（6月上～中旬）の卵塊数が1株当たり0.5を超える場合は、ふ化盛期（6月中旬）に茎葉散布剤で防除する。ただし、R A Cコード：1A、1B、2Bの薬剤に対する感受性が低下している地域では、トレボン粉剤DLを使用する。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
5. イネミギワバエ（第2世代） （イネヒメハモグリバエ）	早い（-）	やや多い（前年よりやや少ない）

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の気温は平年並か高い、降水量は平年並か多い、日照時間は平年並か少ないと予報されている（- / ± ）。

イ、5月中下旬の巡回調査（県北部10地点、県中央部13地点、県南部7地点）における1株当たり卵数は県北部が0.13個（平年0.19個）、県南部が0.03個（平年0.02個）でいずれも平年並、県中央部が0.77個（平年0.45個）でやや多かった（ / + ）。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、有効積算温度計算シミュレーション（J P P - N E T、気象観測地点：秋田）による第2世代幼虫の防除適期は6月2半旬頃と見込まれる。

イ、移植栽培の遅植えや直播栽培では、発生状況を確認し、発生が多い場合は5月24日発表の防除対策情報第3号を参照して防除する。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
6. 斑点米カメムシ類（第1世代） アカスジカスミカメ アカヒゲホソミドリカスミカメ	早い （前年よりやや早い） 早い （前年よりやや早い）	やや少ない （前年より少ない） やや多い （前年よりやや少ない）

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の気温は平年並か高い、降水量は平年並か多いと予報されている(±/±)。

イ、牧草地すくい取り調査におけるアカスジカスミカメの越冬世代幼虫、アカヒゲホソミドリカスミカメの越冬世代成虫の出現時期はいずれも早かった(-/)。

ウ、前年収穫期に行った畦畔すくい取り調査から越冬量は、アカスジカスミカメでやや少なく(/-)、アカヒゲホソミドリカスミカメは多いと推定される(/+)。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、6月上旬から繁殖地となる農道・畦畔、休耕田等の除草を地域でまとまって行う。

イ、水田除草剤を適切に使用し、アカスジカスミカメの侵入原因となる水田内のホタルイ類等のカヤツリグサ科雑草やノビエの除草を確実にを行う。雑草の生育状況を確認し処理時期が遅れないようにする。

ウ、一発処理除草剤のフロアブル剤、顆粒水和剤、ジャンボ剤、少量拡散型粒剤は藻類・表層剥離がほ場の30%以上発生しているほ場では拡散性が劣るので、散布は藻類・表層剥離の発生前から発生初期までとする。

エ、一発処理除草剤の処理時期の遅れなどにより残草が多い場合は、草種に応じた中・後期剤を適切に散布する。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
7. フタオビコヤガ (第1世代) (イネアオムシ)	平年並 (前年並)	平年並 (前年よりやや多い)

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の気温は平年並か高い、降水量は平年並か多いと予報されている(±/±)。

イ、育苗期巡回調査(5月2~3半旬)における育苗施設内の成虫数は0.08頭(平年0.35頭)、卵確認地点率は4.7%(平年5.1%)でいずれも平年並だった(/±)。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、フェルテラ剤(ブイゲットフェルテラ粒剤、D r.オリゼフェルテラ粒剤等)、スピノ剤(プリンススピノ粒剤6、ルーチンアドスピノ箱粒剤等)のいずれも施用せず、食害が多く実害を生じるおそれがある場合は、6月上旬にチューンアップ顆粒水和剤、トレボン粉剤DL、パダン粉剤DLのいずれかを散布する。

8. その他病害虫の発生予報と防除対策

病害虫名	発生時期	発生量		防除上注意すべき事項
		現況	予想	
縞葉枯病	-	-	平年並	防除が必要なほ場はないと見込まれる。
ニカメイガ (2回発生地帯の 第1世代)	-	-	平年並	防除が必要なほ場は少ないと見込まれる。

B 小麦

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
1. 赤かび病	早い (－)	やや少ない (前年並)

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の気温は平年並か高い、降水量は平年並か多いと予報されている (－/±)。

イ、各地域振興局管内の定点調査によると、秋田地域における銀河のちからの出穂期は5月4日 (平年差－8日)、仙北地域におけるネバリゴシの出穂期は5月15日 (平年差－5日) だった (－/)。

ウ、5月中旬以降、降雨が少ないことから、感染量はやや少ないと推定される (/－)。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、まだ防除を行っていない場合は、直ちにシルバキュアフロアブル又はストロビーフロアブルを散布する。その後7～10日後に2回目の防除をする。

イ、2回目の防除は、シルバキュアフロアブル、ストロビーフロアブル、トップジンM水和剤、トップジンM粉剤DL、イオウフロアブル、石灰硫黄合剤のいずれかを散布する。ただし、1回目と同じ薬剤は使用しない。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
2. うどんこ病	－	やや多い (前年よりやや少ない)

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の気温は平年並か高い、降水量は平年並か多いと予報されている (/±)。

イ、前年乳熟期の発生量から、越冬伝染源量は多いと推定される (/+)。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、本病は赤かび病と同時防除が可能である。

イ、耐性菌の出現を回避するため、ローテーション散布を行う。

3. その他病害虫の発生予報と防除対策

病害虫名	発生時期	発生量		防除上注意すべき事項
		現況	予想	
さび病	－	－	平年並	赤かび病との同時防除が可能である。

C 大豆

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
1. ネキリムシ類	－	平年並 (前年並)

(1) 予報の根拠

ア、秋田市予察ほのタマナヤガフェロモントラップにおける4月1半旬～5月5半旬の誘殺数は79頭 (平年64.6頭) で平年並だった (/±)。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、タマナヤガの成虫はタデ、アカザなどの広葉雑草に産卵するので、播種前にはほ場内やほ場周辺

の雑草処理を行う。

イ、例年被害が見られるほ場では、次のいずれかの方法で防除する。

- ① クルーザーF S30又はクルーザーMAXXを種子に塗沫処理して播種する。
- ② 播種時にカルホス粉剤又はカルホス微粒剤Fを作条施用し、土壌混和する。
- ③ 播種時～本葉2葉期にカルホス粉剤又はネキリエースKを株元の土壌表面に散布する。

ウ、タマナヤガは長距離移動性害虫であり、飛来数が急激に増加することがあるので、今後の予察情報に注意する。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
2. 食葉性鱗翅目幼虫	—	平年並 (前年並)

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の気温は平年並か高い、降水量は平年並か多いと予報されている (/±)。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、ツメクサガは年2回発生し、第1世代幼虫は主に6～7月に発生する。葉脈を残して葉を食害するので、ほ場をよく観察する。

イ、発生が多い場合は、ツメクサガ幼虫の発生初期 (若齢期) にエルサン乳剤、トレボン乳剤、フェニックスフロアブルを散布する。

D ねぎ (夏どり)

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
1. べと病	—	やや多い (前年並)

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の降水量は平年並か多いと予報されている (/+)。

イ、5月4半旬の巡回調査における発病株率は0% (平年0%) で平年並だった (/±)。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、気温が15℃前後で降雨が続くと発病しやすく、被害の拡大が早い。定期的にジマンダイセン水和剤等を散布し、予防に努める。

イ、発病が見られたらオロンディスウルトラSC (RACコード: 40・49)、ザンプロDMフロアブル (同: 40・45)、リドミルゴールドMZ (同: M3・4)等を散布する。

ウ、RACコード: 4、11、27、40、45、49の薬剤は、耐性菌の出現を回避するため、連用しない。

E きゅうり

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
1. 黒星病	—	やや少ない (前年並)

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の気温は平年並か高い、降水量は平年並か多いと予報されている (/±)。

イ、前年の9月の発生量から、越冬伝染源量はやや少ないと推定される (/-)。

(2) 防除上注意すべき事項

- ア、本病は冷涼多湿条件で発病が多く、県北部で発生しやすい。
- イ、多発すると薬剤による防除が難しくなるため、発病前から定期的にベフドー水和剤、ジマンダイセン水和剤、ダコニール1000等を散布し、予防に努める。特に、前年秋に発病が多かったほ場では定植直後から防除を開始する。
- ウ、発病を確認した場合は、茎葉、果実、巻きひげ等の発病部位を取り除き、速やかにスコア顆粒水和剤、トップジンM水和剤、ベンレート水和剤等を散布する。

F キャベツ（初夏どり）

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
1. 菌核病	やや早い(前年よりやや遅い)	多い(前年よりやや多い)

(1) 予報の根拠

- ア、向こう1か月の気温は平年並か高い、降水量は平年並か多いと予報されている（-/+）。
- イ、5月4半旬の巡回調査における発病株率は0%（平年0.1%）で平年並だった（ /±）。
- ウ、前年の初夏どりでの発生量から、越冬伝染源量はやや多いと推定される（ /+）。

(2) 防除上注意すべき事項

- ア、前年に発病が見られたほ場では、結球始期からスミレックス水和剤、ネクスターフロアブル、ロブラール水和剤等を散布する。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
2. コナガ	—	やや多い(前年よりやや多い)

(1) 予報の根拠

- ア、向こう1か月の気温は平年並か高い、降水量は平年並か多いと予報されている（ /+）。
- イ、秋田市予察ほにおける5月1半旬～5月5半旬のフェロモントラップの誘殺数は161頭（平年122頭）でやや多かった（ /+）。
- ウ、5月4半旬の巡回調査における株当たり幼虫数は0頭（平年0.03頭）でやや少なかった（ /-）。

(2) 防除上注意すべき事項

- ア、5月11日発表の防除対策情報第2号を参照して防除する。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
3. モンシロチョウ	—	平年並（前年並）

(1) 予報の根拠

- ア、向こう1か月の気温は平年並か高い、降水量は平年並か多いと予報されている（ /+）。
- イ、5月4半旬の巡回調査における株当たり幼虫数は0頭（平年0.02頭）でやや少なかった（ /-）。

(2) 防除上注意すべき事項

- ア、コナガとの同時防除に努める。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
4. ヨトウガ (第1世代)	平年並 (前年並)	やや多い(前年よりやや多い)

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の気温は平年並か高い、降水量は平年並か多いと予報されている(±/+)。

イ、秋田市予察ほのフェロモントラップにおける4月5半旬～5月5半旬の越冬世代成虫の誘殺数は1頭(平年1.4頭)で平年並だった(/±)。

ウ、5月4半旬の巡回調査における株当たり幼虫数は0頭(平年0頭)で平年並だった(/±)。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、コナガとの同時防除に努める。

G えだまめ

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
1. ネキリムシ類	—	平年並 (前年並)

(1) 予報の根拠

ア、秋田市大豆予察ほのタマナヤガフェロモントラップにおける4月1半旬～5月5半旬の誘殺数は79頭(平年64.6頭)で平年並だった(/±)。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、タマナヤガの成虫はタデ、アカザなどの広葉雑草に産卵するので、播種前には場内やほ場周辺の雑草処理を行う。

イ、例年被害が見られるほ場では、次のいずれかの方法で防除する。

①クルーザーF S30又はクルーザーMAXXを種子に塗沫処理して播種する。

②播種時にカルホス粉剤又はカルホス微粒剤Fを作条施用し、土壌混和する。

③播種時～本葉2葉期にカルホス粉剤又はネキリエースKを株元の土壌表面に散布する。

ウ、タマナヤガは長距離移動性害虫であり、飛来数が急激に増加することがあるため、今後の予察情報に注意する。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
2. 食葉性鱗翅目幼虫	—	平年並 (前年並)

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の気温は平年並か高い、降水量は平年並か多いと予報されている(/±)。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、ツメクサガは年2回発生し、第1世代幼虫は主に6～7月に発生する。葉脈を残して葉を食害するため、ほ場をよく観察する。

イ、発生が多い場合は、ツメクサガ幼虫の発生初期(若齢期)にアディオソ乳剤、トレボン乳剤、フェニックスフロアブルを散布する。

H りんどう

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
1. 葉枯病	—	多い（前年より多い）

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の気温は平年並か高い、降水量は平年並か多いと予報されている（ /+）。

イ、5月中旬の巡回調査における発病茎率は12.9%（平年5.1%）で高かった（ /+）。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、過剰な追肥を控え、過繁茂を避ける。

イ、オンリーワンフロアブル、ベフラン液剤25等の薬剤で防除するが、花の汚れを避けるためにオースサイド水和剤80やZボルドーは着蕾期以降使用しない。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
2. リンドウホソハマキ （第1世代）	早い（—）	平年並（前年よりやや多い）

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の気温は平年並か高い、降水量は平年並か多いと予報されている（—/+）。

イ、有効積算温度計算シミュレーション（JPP-NE T、気象観測地点：秋田）による越冬後幼虫の羽化始期は5月26日（平年6月1日）で早かった（—/ ）。

ウ、5月中旬の巡回調査における発生茎率は0%（平年0.02%）でやや低かった（ /—）。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、茎部に食入後の幼虫は薬剤防除が難しいため、生長部の被害を見つけたら折り取り、土中に埋めるなど適切に処分する。

イ、ほ場をよく観察し、成虫又は潜葉痕および食害痕が認められたら、直ちにアディオフロアブル、ディアナSC、フェニックス顆粒水和剤等の薬剤で防除する。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
3. ハダニ類	やや早い（—）	やや多い（前年より多い）

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の気温は平年並か高い、降水量は平年並か多いと予報されている（—/+）。

イ、5月中旬の巡回調査における発生茎率は0%（平年0%）で平年並だった（ /±）。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、発生初期からカネマイトフロアブル、コロマイト水和剤、バロックフロアブル等の薬剤で防除する。

I りんご

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
1. 斑点落葉病	早い（前年よりやや早い）	やや少ない （前年より少ない）

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の気温は平年並か高い、降水量は平年並か多いと予報されている（±/±）。

イ、ふじの落花期は果樹試験場（横手市）が5月7日（平年差－8日）、かづの果樹センター（鹿角市）が5月12日（平年差－7日）だった（-/ ）。

ウ、前年9月の発生量から、越冬伝染源量はやや少ないと推定される（ /-）。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、防除薬剤は約2週間の間隔で散布するが、降雨が続くと予想される場合は散布間隔を短くする。

イ、高温・多雨の多発条件下では、ポリオキシシナL水和剤（RACコード：19）、ユニックス顆粒水和剤47（同：9）のいずれかを主剤に加用して使用する。ただし、これらの剤は年1回の使用とする。また、ポリオキシシナL水和剤の効力が低下している園地では同剤を使用しない。

ウ、QoI剤（RACコード：11）は耐性菌の出現を回避するため、年2回以内の使用とし、保護殺菌剤（ベルコート水和剤、有機銅剤等）を加用する。

エ、以下の各薬剤はサビ果を発生させるおそれがあるので、期日まで使用しない。

①オキシラン水和剤、キノンドー水和剤40等の銅剤（RACコード：M1）やパスポート顆粒水和剤（同：M5）は、落花20日後頃まで使用しない。

②ダイパワー水和剤（RACコード：M7・M4）、ベルコート水和剤（同：M7）は、落花25日後頃まで使用しない。

③ストライド顆粒水和剤（RACコード：M11）は落花30日後まで使用しない。

④ベフキノン水和剤（RACコード：M7・M1）は落花40日後頃まで使用しない。また、千秋、玉林では果実色に障害を生じるおそれがあるので7月上旬まで使用しない。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
2. モニリア病 （実（株）ぐされ）	—	やや少ない（前年並）

(1) 予報の根拠

ア、5月上旬の巡回調査における花ぐされ発病果そう率は0.0%（平年0.1%）、発病地点率は4.5%（平年10.7%）でいずれもやや低かった（ /-）。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、実（株）ぐされは翌年の伝染源となるため、見つけ次第摘み取って焼却するか土中に埋める。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
3. 黒星病	—	県北部：やや多い (前年より多い) 県中央部・県南部：平年並 (前年並)

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の気温は平年並か高い、降水量は平年並か多いと予報されている（ /±）。

イ、県北部の5月中旬の巡回調査における発病花そう率は0.9%（平年0.2%）でやや高かった（ /+）。

ウ、県中央部・県南部の5月中旬の巡回調査における発病花そう率は0%（平年0%）で平年並だった（ /±）。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、発病部位は直ちに摘み取り適切に処分する。摘果作業の際は発病の有無をよく観察し、発病果実を園内に残さないように注意する。

イ、過繁茂を防ぐため、新梢等の生育が旺盛な場合は、枝の配置を見直し徒長枝を整理する。

ウ、落花25日後までは10日間隔で防除する。その後は2週間間隔で散布するが、降雨が続くと予想される場合は散布間隔を短くする。散布予定日に降雨が予想される場合は、降雨前に散布する。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	感 染 時 期	感 染 量
4. 炭疽病	早い（－）	平年並（－）

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の降水量は平年並か多いと予報されている（ /±）。

イ、ふじの落花期は果樹試験場（横手市）が5月7日（平年差－8日）、かづの果樹センター（鹿角市）が5月12日（平年差－7日）だった（－/ ）。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、ニセアカシアが伝染源となるので、園地の近くにある場合は伐採する。

イ、防除薬剤は約2週間の間隔で散布するが、降雨が続くと予想される場合は散布間隔を短くする。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	感 染 時 期	感 染 量
5. 輪紋病	早い（－）	平年並（－）

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の降水量は平年並か多いと予報されている（ /±）。

イ、ふじの落花期は果樹試験場（横手市）が5月7日（平年差－8日）、かづの果樹センター（鹿角市）が5月12日（平年差－7日）だった（－/ ）。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、防除薬剤は約2週間の間隔で散布するが、降雨が続くと予想される場合は散布間隔を短くする。

イ、枝幹のいぼ病斑は削り取り、トップジンMペーストを塗布する。なお、本剤の使用回数は3回以内である。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
6. シンクイムシ類 (モモシンクイガ)	早い (前年並)	やや少ない (-)

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の気温は平年並か高いと予報されている (-/±)。

イ、果樹試験場(横手市)の予察ほにおける越冬世代成虫の初誘殺は5月6半旬(平年6月1半旬)で早かった (-/)。

ウ、前年9月の発生量から、越冬量はやや少ないと推定される (/-)。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、被害果は摘み取り、6日以上水漬けする。

イ、成虫は20~22時の気温が18℃以上になると産卵を開始するので、産卵状況に注意し適期に殺卵剤を散布する。

ウ、合成ピレスロイド剤(バイスロイドEW、サイハロン水和剤等)(RACコード:3A)の散布適期は、県北部が7月上~中旬、県中央部・県南部が6月下旬~7月上旬と見込まれる。

エ、交信かく乱剤の使用を予定している場合は、直ちに設置する。

オ、園地の周辺に放任園や防除不良園がある場合は、発生動向に注意して防除する。

カ、サイアノックス水和剤、スミチオン水和剤40(RACコード:1B)、パーマチオン水和剤(同:3A・1B)は、サビ果を発生させるおそれがあるので、落花後1か月間は使用しない。また、スミチオン水和剤40、パーマチオン水和剤は、薬害(黄変落葉)を発生させるおそれがあるので、高温時や衰弱樹には散布しない。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
7. ナミハダニ	-	多い(前年より多い)

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の気温は平年並か高いと予報されている (/±)。

イ、5月中旬の巡回調査における葉当たり発生頭数は0.003頭(平年0.000頭)で多かった (/+)。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、発生の多い園地では、直ちに殺ダニ剤を散布する。

イ、ハダニ類は薬剤抵抗性が発達しやすいので、殺ダニ剤は1薬剤年1回の使用に限定し、かつ作用点が同一の剤も年1回の使用として、効力低下を防ぐ。

ウ、ダニサラバフロアブル(RACコード:25A)、スターマイトフロアブル(同:25A)、ダニコングフロアブル(同:25B)は作用点が同一のため、連用を避ける。

エ、以下の各薬剤の混用をする場合は、凝集を避けるため先に殺ダニ剤を希釈し、よく攪拌する。

①カネマイトフロアブル(RACコード:20B)にアリエッティC水和剤(同:M4・P7)を混用。

②マイトコーネフロアブル(RACコード:20D)にアリエッティC水和剤又はベフラン液剤25(同:M7)を混用。また、薬害(黄変落葉)を発生させるおそれがあるので、マイトコーネフロアブルとスミチオン水和剤40(RACコード:1B)は混用しない。

③ダニサラバフロアブルにアリエッティC水和剤又はカルシウム剤を混用。

④スターマイトフロアブルにアリエッティC水和剤又はベフラン液剤25を混用。

オ、ダニオーテフロアブル(RACコード:33)を使用する場合は、防除効果の低下を避けるため、銅剤(銅を含む製剤)を使用しない。

カ、エコマイト顆粒水和剤（RACコード：23）の適用作物はりんごとおうとうのみなので、これら以外の果樹類に薬液がかからないようにする。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
8. ハマキムシ類（第1世代） （リンゴコカクモンハマキ） （リンゴモンハマキ）	平年並（－）	やや少ない （前年よりやや少ない）

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の気温は平年並か高いと予報されている（±/ ）。

イ、5月中旬の巡回調査における被害花そう率は0.1%（平年0.2%）でやや低かった（ /－）。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、フェロモントラップ設置園では、誘殺最盛期の2週間後に防除薬剤を散布する。

イ、防除薬剤は、オリオン水和剤40（RACコード：1A）、ディアナWDG（同：5）、ジアミド剤（サムコルフロアブル10、エクレスルSE等）（同：28）のいずれかを散布する。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
9. 果樹カメムシ類 （クサギカメムシ） （チャバネアオカメムシ）	－	多い（前年より多い）

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の気温は平年並か高いと予報されている（ /±）。

イ、県内7か所の防除適期決定ほにおける5月1～4半旬のチャバネアオカメムシフェロモントラップへの果樹カメムシ類の平均誘殺数は17.7頭（平年10.8頭）で多かった（ /+）。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、園内へのカメムシ類の飛来時期や飛来数は地域によって異なるので、飛来状況をよく観察する。特に、山間部の園地では注意する。

イ、園内への飛来が多い場合は、アクタラ顆粒水溶剤、アルバリン顆粒水溶剤、スタークル顆粒水溶剤、ダントツ水溶剤等を散布する。

ウ、スミチオン水和剤40は、サビ果を発生させるおそれがあるので、落花後1か月間は使用しない。また、スミチオン水和剤40は薬害（黄変落葉）を発生させるおそれがあるので、高温時や衰弱樹には散布しない。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
10. キンモンホソガ （第2世代）	－	やや少ない（前年並）

(1) 予報の根拠

ア、前年9月の発生量から、越冬量はやや少ないと推定される（ /－）。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、第1世代幼虫の被害が多い台木のひこばえを切り取る。

イ、被害葉は摘み取り適切に処分する。

ウ、パーマチオン水和剤は、落花1か月後以降に使用し（サビ果）、高温時や衰弱樹に散布しない（黄変落葉）。

11. その他病害虫の発生予報と防除対策

病害虫名	発生時期	発生量		防除上注意すべき事項
		現況	予想	
リンゴハダニ	—	平年並	平年並	防除が必要な園地は少ないと見込まれるが、発生が見られる園地ではバロックフロアブル（RACコード：10B）等を散布する。

J なし（日本なし）

病害虫名	予報内容	
	発生時期	発生量
1. 黒星病	—	やや多い（前年より多い）

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の降水量は平年並か多いと予報されている（ /±）。

イ、潟上市の予察ほにおける果そう葉の初発日は5月14日（平年5月19日）でやや早かった（ /+）。

ウ、5月中旬の巡回調査における発病果そう葉率は0%（平年0%）で平年並だった（ /±）。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、被害部位は早めに除去し、園外へ搬出して処分する。

イ、防除薬剤の散布は10日間隔で行い、降雨が続くと予想される場合又は被害が発生している園地では散布間隔を7日とする。幸水は、本病に弱いので特に注意して防除する。

ウ、有袋栽培の場合は、散布した防除薬剤が乾いたら速やかに袋かけを行う。

病害虫名	予報内容	
	発生時期	発生量
2. 黒斑病	—	平年並（前年並）

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の降水量は平年並か多いと予報されている（ /±）。

イ、5月中旬の巡回調査における発病果そう葉率は0.09%（平年0.06%）で平年並だった（ /±）。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、発病の多い品種は、南水、八雲、二十世紀である。

イ、不要な徒長枝は早めに剪去し、適切に処分する。

ウ、袋かけ前の防除を徹底し、散布後、早めに袋をかける。

エ、発生が予想される園地では、ナリアWDG（RACコード：11・7）、ユニックス顆粒水和剤47（同：9）を散布する。ただし、ユニックス顆粒水和剤47は単用せず、主剤に加用して散布する。

オ、多発条件下では、ポリオキシNAL水和剤（RACコード：19）を主剤に加用するか、ポリキャプタン水和剤等（同：19・M4）を散布する。ただし、耐性菌の出現を回避するため、ポリオキシN剤の使用回数は年間3回以内とする。

カ、防除薬剤の散布は10日間隔で行い、降雨が続くと予想される場合又は被害が発生している園地では散布間隔を7日とする。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	感 染 時 期	感 染 量
3. 輪紋病	—	平年並 (—)

(1) 予報の根拠

- ア、向こう1か月の降水量は平年並か多いと予報されている (/±)。
- イ、前年収穫期の発生量から、越冬伝染源量は平年並と推定される (/±)。

(2) 防除上注意すべき事項

- ア、伝染源であるいぼ病斑の多い枝は切除し焼却処分する。枝幹の病斑は削り取り、トップジンMペーストを塗布する (塗布は年3回以内)。
- イ、防除薬剤の散布は10日間隔で行う。高温、多雨の場合は散布間隔を7日間隔程度とする。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
4. シンクイムシ類 (モモシンクイガ)	早い (前年並)	平年並 (—)

(1) 予報の根拠

- ア、潟上市予察ほにおける越冬世代成虫の初誘殺は、5月6半旬 (平年6月2半旬) で早かった (—/)。
- イ、前年の収穫期の発生量から、越冬量は平年並と推定される (/±)。

(2) 防除上注意すべき事項

- ア、被害果は第2世代以降の発生源となるので必ず摘み取り、6日以上水漬けする。
- イ、成虫は20~22時の気温が18℃以上になると産卵を開始するので、産卵状況に注意し、適期に殺卵剤を散布する。
- ウ、園地の周辺に放任園や防除不良園がある場合は、発生動向に注意して防除する。
- エ、合成ピレスロイド剤 (RACコード:3A) の散布適期は、県北部が7月上~中旬、県中央部が6月下旬~7月上旬と見込まれる。
- オ、モスピラン顆粒水溶剤 (RACコード:4A) は、長十郎、新高、八雲、愛甘水に対して薬害のおそれがあるので散布しない (葉裏に黒色斑)。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
5. ナミハダニ		平年並 (前年よりやや多い)

(1) 予報の根拠

- ア、向こう1か月の気温は平年並か高いと予報されている (/±)。
- イ、5月中旬の巡回調査における葉当たり発生頭数は0頭 (平年0.0頭) で平年並だった (/±)。

(2) 防除上注意すべき事項

- ア、不要な徒長枝は早めに剪去し、適切に処分する。
- イ、発生が多い園地では直ちに殺ダニ剤を散布する。
- ウ、ハダニ類は薬剤抵抗性が発達しやすいため、殺ダニ剤は、1薬剤年1回の使用に限定し、かつ

作用点が同一の薬剤は、年1回の使用として、効力低下を防ぐ。

エ、ダニオーテフロアブル（RACコード：33）を使用する園では、オキシラン水和剤（同：M4・M1）などの銅を含む製剤を使用しない（銅剤と混用及び近接散布での防除効果の低下）。

病虫害名	予報内容	
	発生時期	発生量
6. ハマキムシ類	—	多い（前年より多い）

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の気温は平年並か高いと予報されている（ /±）。

イ、5月中旬の巡回調査における被害新梢率は3.1%（平年0.0%）で高かった（ /+）。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、発生が多い園地ではジアミド系剤等を散布する。

病虫害名	予報内容	
	発生時期	発生量
7. 果樹カメムシ類 （クサギカメムシ） （チャバネアオカメムシ）	—	多い（前年より多い）

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の気温は平年並か高いと予報されている（ /±）。

イ、県内4か所の防除適期決定ほにおける5月1～4半旬のチャバネアオカメムシフェロモントラップへの果樹カメムシ類の平均誘殺数は31.0頭（平年13.0頭）で多かった（ /+）。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、園内へのカメムシ類の飛来時期は年次変動が大きく、飛来数も場所によって異なることから、飛来状況をよく観察して防除する。

イ、園内への飛来が多い場合はネオニコチノイド剤、有機リン剤、合成ピレスロイド剤のいずれかを散布する。ただし、合成ピレスロイド剤は6月下旬以降の使用とする。

8. その他病虫害の発生予報と防除対策

病虫害名	発生時期	発生量		防除上注意すべき事項
		現況	予想	
アブラムシ類 （ユキヤナギアブラムシ）	—	平年並	平年並	シンクイムシ類、果樹カメムシ類と同時防除する。
リンゴハダニ	—	平年並	平年並	ナミハダニと同時防除する。

K ぶどう

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
1. ベと病	—	やや少ない (前年よりやや少ない)

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の降水量は平年並か多いと予報されている（ /±）。

イ、前年収穫期の発生量から、越冬伝染源量はやや少ないと推定される（ /-）。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、アリエッティ水和剤（RACコード：P7）は果粒が小豆大以降の散布で薬害や果粉の溶脱のおそれがあるため、落花7日後までに使用する。

イ、ホライズンドライフロアブル（RACコード：27・11）は果粒が小豆大以降の散布で、アミスター10フロアブル、ストロビードライフロアブル（同：11）、フェスティバル水和剤（同：40）、ベトファイター顆粒水和剤（同：27・40）、ライメイフロアブル、ランマンフロアブル（同：21）は果粒が大豆大以降の散布で、それぞれ果粉の溶脱を起こすおそれがあるため、散布時期に注意する。

ウ、QoI剤（RACコード：11）、QiI剤（同：21）、カルボン酸アミド剤（同：40）又はシモキサニル（同：27）を含む農薬及びエトフィンフロアブル（同：22）は年間1～2回の使用とし、同じRACコードの薬剤を連用しない。特に、QoI剤の耐性菌が確認されている地域では、本剤をベと病防除薬剤として使用しない。

エ、ゾーバックエニベル顆粒水和剤（RACコード：49・M3）は年間1回の使用とする。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	感 染 時 期	感 染 量
2. 芽枯病	早い（-）	やや多い（-）

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の降水量は平年並か多いと予報されている（ /±）。

イ、果樹試験場（横手市）における展葉期は、キャンベル・アーリーが4月24日（平年差-9日）、巨峰が4月29日（平年差-7日）、シャインマスカットが5月1日（平年差-5日）だった（-/）。

ウ、5月中旬の巡回調査における発病芽率は、キャンベル・アーリーが4.1%（平年2.6%）でやや高く、巨峰が0%（平年0.8%）でやや低く、シャインマスカットが1.1%（平年0.4%）でやや高かった（ /+）。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、感染した新梢は翌春に芽枯症状を呈する。

イ、発病枝は剪去し、適切に処分する。

ウ、開花期間に雨が多いと翌春に多発するおそれがあるので、オーシャイン水和剤（RACコード：3）、トップジンM水和剤、ベンレート水和剤（同：1）のいずれかを開花前に散布する。

エ、上記の剤は耐性菌の出現を回避するため、同じRACコードの薬剤の使用回数を年間1～2回とし、連用は避ける。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
3. 灰色かび病	—	平年並（前年よりやや多い）

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の気温は平年並か高い、降水量は平年並か多いと予報されている（ /±）。

イ、5月中旬の巡回調査における発病葉率は、キャンベル・アーリー、巨峰、シャインマスカットが0%（平年0%）でいずれも平年並だった（ /±）。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、花冠、不受精果などの花き残さは成熟果での伝染源となるので、果粒肥大前（袋かけ前）に払い落とす。

イ、発病花穂や発病葉のほか、落葉や芽かきした枝葉も伝染源となるため、適切に処分する。

ウ、花穂の防除が重要であることから、開花前と落花後の散布間隔を10日以上空けない。

エ、アミスター10フロアブル、ストロビードライフロアブル（RACコード：11）及びスイッチ顆粒水和剤（同：9・12）は、いずれも果粒が大豆大以降の散布により果粉溶脱を起こすおそれがあるので、その前までに散布する。

オ、カンタスドライフロアブル（RACコード：7）は浸透性を高める効果のある展着剤や葉面散布剤を加用すると薬害（葉の白化）が発生するおそれがあるため混用しない。

カ、開花直前にゲッター水和剤（RACコード：10・1）、チオノックフロアブル、トレノックスフロアブル（同：M3）、フルピカフロアブル（同：9）、ロブラール水和剤（同：2）、SDHI剤（ネクスターフロアブル、パレード15フロアブル等）（同：7）、ミギワ20フロアブル（同：52）のいずれかを散布する。

キ、落花直後にゲッター水和剤、ジチオカーバメート剤、フルピカフロアブル、ロブラール水和剤SDHI剤、QoI剤（アミスター10フロアブル、ストロビードライフロアブル等）（RACコード：11）、スイッチ顆粒水和剤（同：9・12）、のいずれかを散布する。

ク、落花7日後にQoI剤、スイッチ顆粒水和剤、オンリーワンフロアブル（RACコード：3）のいずれかを散布する。

ケ、チオノックフロアブル、トレノックスフロアブルを除くエ～キに記した剤は、耐性菌の出現を回避するため、いずれの剤も年1回の使用に限定し、かつ同じRACコードの薬剤は連用を避ける。

コ、チオノックフロアブル、トレノックスフロアブルは幼果期～袋掛けまでの散布は、果房の汚れや果粉溶脱を生じることがあるので注意する。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
4. 晩腐病（花蕾発病）	—	平年並（前年並）

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の降水量は平年並か多いと予報されている（ /±）。

イ、前年収穫期の発生量から、越冬伝染源量は平年並と推定される（ /±）。

(2) 防除上注意すべき事項

ア、発病花穂は摘み取り、適切に処分する。

イ、笠かけ、袋かけは防除効果が高いのでできるだけ早く始め、遅くとも7月中旬までに終える。

ウ、開花前にジチオカーバメート剤（ジマンダイセン水和剤、チオノックフロアブル等）（RAC

- コード：M3)、ゾーベックエニベル顆粒水和剤(同：49・M3)のいずれかを散布する。
- エ、落花直後にジチオカーバメート剤、ゾーベックエニベル顆粒水和剤、スイッチ顆粒水和剤(RACコード：9・12)、QoI剤(アミスター10フロアブル、ストロビードライフフロアブル等)(同：11)のいずれかを散布する。
- オ、落花7日後にオンリーワンフロアブル(RACコード：3)、スイッチ顆粒水和剤、QoI剤のいずれかを散布する。
- カ、アミスター10フロアブル、ストロビードライフフロアブル及びスイッチ顆粒水和剤は、いずれも果粒が大豆大以降の散布により果粉溶脱を起こすおそれがあるので、その前までに散布する。
- キ、ジマンダイセン水和剤、チオノックフロアブル、トレノックスフロアブルを除く上記の剤は、耐性菌を出現を回避するため、同一系統薬剤の使用を年1～2回に限定し、かつ同じRACコードの薬剤は連用を避ける。
- ク、チオノックフロアブル、トレノックスフロアブルは幼果期～袋掛けまでの散布は、果房の汚れや果粉溶脱を生じることがあるので注意する。

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
5. チャノキイロアザミウマ	平年並(－)	平年並(前年並)

(1) 予報の根拠

ア、向こう1か月の気温は平年並か高いと予報されている(±/±)。

(2) 防除上注意すべき事項

- ア、ディアナWDG(RACコード：5)、テッパン液剤(同：28)、合成ピレスロイド剤(スカウトフロアブル、バイスロイドEW等)(同：3A)、ネオニコチノイド剤(ダントツ水溶剤、モスピラン顆粒水溶剤等)(同：4A)を散布する。
- イ、バイスロイドEWは小粒種ぶどうに登録がなく、大粒種ぶどうでのみ使用できる。
- ウ、合成ピレスロイド剤の年間使用回数は1～2回とする。
- エ、ダントツ水溶剤は小豆大期以降、モスピラン顆粒水溶剤やバイスロイドEW、ディアナWDG、テッパン液剤は大豆大期以降の散布で果粉溶脱を生じるおそれがあり、その前又は袋かけ以降に使用する。

L 飼料作物

病 害 虫 名	予 報 内 容	
	発 生 時 期	発 生 量
1. アワヨトウ(第1世代)	早い(－)	やや多い(前年より多い)

(1) 予報の根拠

ア、糖蜜トラップ調査(県内2か所)における侵入世代の初確認(能代市)は5月2半旬(平年5月5半旬)で早く、5月1～5半旬の総誘殺数は2頭(平年1.0頭)でやや多かった(－/+)

(2) 防除上注意すべき事項

- ア、有効積算温度計算シミュレーション(JPP-NE T、気象観測地点：秋田)における第1世代の中齢幼虫の発生時期は6月1半旬と予想されるため、牧草地などでの発生に注意する。幼虫の体色が黒い場合(群生相)は激しい食害を受ける可能性が高いため、牧草を早めに刈り取る。
- イ、本種は長距離移動性害虫であり、飛来数が急激に増加することがあるので、今後の予察情報に注意する。

IV. 気象予報

令和5年5月25日仙台管区气象台発表 東北地方1か月予報（5月27日～6月26日）

（1）予報のポイント

- ・ 期間のはじめに暖かい空気に覆われやすいため、向こう1か月の気温は平年並か高いでしょう。
- ・ 気圧の谷や前線の影響で、向こう1か月の降水量は平年並か多く、日照時間は平年並か少ないでしょう。

（2）向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率（東北日本海側）


	低い（少ない）	平年並	高い（多い）
気 温	20%	40%	40%
降水量	20%	40%	40%
日照時間	40%	40%	20%

（3）気温経過の各階級の確率（東北日本海側）


	低い	平年並	高い
5/27～6/2（1週目）	20%	30%	50%
6/3～6/9（2週目）	20%	50%	30%
6/10～6/23（3～4週目）	30%	40%	30%

V. 気象データ (秋田市、1月1半旬～5月5半旬 秋田県農業気象システムより)


気温の推移



降水量の推移



日照時間の推移



VI. 用語の説明

発生時期

平年の発生日からの差を5段階評価で予測します。

日数	~-6	-5	-4	-3	-2	-1	平年 発生日	+1	+2	+3	+4	+5	+6~
評価	早い	やや早い		平年並				やや遅い		遅い			

発生量

発生密度の平年値からの差を5段階評価で予測します。密度のばらつきの差で示されるので、毎年発生密度が大きく変化する病害虫では、平年値からよほど大きくずれないと「多い」や「少ない」の評価にはなりません。平年値との比較なので、平年値が小さければ、「多い」になっても見かけの密度は多くないことがあります。毎年多発生している場合は「平年並」や「やや少ない」でも見かけ上は多いと感ずることがあります。

平年値 ↓						
度数	10%	20%	20%	20%	20%	10%
評価	少ない	やや少ない	平年並		やや多い	多い

予報の根拠

予報の根拠に示している（ / ）は予察の要因で、（発生時期/発生量）を表しています。

発生時期が「遅い」場合は「+」、「早い」場合は「-」となります。発生量が「多い」場合は「+」、「少ない」場合は「-」となります。

発生時期、発生量ともに、「平年並」の場合は「±」、関係しないときは「空欄」となります。

気象の確率予報

出現が見込まれる確率予報は、高い（多い）確率が50%以上の場合は「高い（多い）」、低い（少ない）確率が50%以上の場合は「低い（少ない）」となります。低い（少ない）確率が20%で平年並と高い（多い）確率がそれぞれ40%の場合は「平年並か高い（多い）」、高い（多い）と平年並が40%で低い（少ない）が20%の場合は「平年並か低い（少ない）」となります。また、それぞれの確率が30~40%の場合は「ほぼ平年並」となります。

出現確率(低い(少ない):平年並:高い(多い))	解説
高い(多い)確率が50%以上 (20:40:40)	高い(多い) 平年並か高い(多い)
平年並の確率が50%以上 (40:30:30) (30:40:30) (30:30:40)	平年並 ほぼ平年並
(40:40:20)	平年並か低い(少ない)
低い(少ない)確率が50%以上	低い(少ない)

半旬のとり方

ここで扱われる「半旬」とは暦日半旬のことで、毎月1日から5日ごとに区切った期間となります。1半旬は1日から5日まで、2半旬は6日から10日までであり、以降6半旬まで5日ごとに該当する期間を指します。

令和5年度秋田県農薬危害防止運動
～農薬を安全に正しく使いましょう！～

6月1日から8月31日まで「農薬危害防止運動」の実施期間です。
農薬の安全かつ適正な使用及び管理を徹底しましょう。

守ろう農薬ラベル 確かめよう周囲の状況

ラベルの確認



帳簿に記録

周辺への配慮



飛散の防止



土壌くん蒸剤は必ず被覆



施錠して保管



https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_tekisei/

農薬の適正使用 農林水産省

検索



詳しくは
こちら

令和5年度農薬危害防止運動 農林水産省・厚生労働省・環境省・都道府県共催