令和6年6月19日

小麦情報

秋田地域振興局 農林部 農業振興普及課
No.2
Tel. 018－860－3410
Fax. 018－860－3834

適期収穫で高品質を目指しましょう！

1 気象経過（R6. 5月～6月現在）

アメダス大潟





〈概況〉

５月５～６半旬にかけて気温が低く推移しましたが、６月に入ってからは平年並～高く推移しています。また、６月の日照時間は多く、降水量は少なく推移しています。

６月13日に仙台管区気象台から発表された東北地方の１か月予報では、向こう１か月気温は高く、特に、期間の前半はかなり高くなる見込みです。今後の気象経過や子実水分に注意し、適期収穫を徹底してください。

２ R6年産小麦の生育状況（R6年6月18日現在）

・６月18日の調査では、銀河のちからの稈長は78.3cm（平年比93%、前年比95%）、穂数は515本/㎡（平年比96%、前年比116%）、穂長は74.6mm（平年比90%、前年比98%）となっています。稈長・穂長は平年より短く、穂数は概ね平年並となっています。

・今年は出穂期が平年より早く、その後の気温が高く推移したため、成熟期（平年：６月25日）が早まると予想されます。

表１　６月18日の生育調査結果（「銀河のちから」４地点平均）

	6月18日		
	稈長（cm）	穂数（本/㎡）	穂長（cm）
R6年産	78.3	515	7.6
平年比（%）	93	96	90
前年比（%）	95	116	98

※農業振興普及課調査

３ 異形株・大型雑草の抜き取りと刈り分けの実施

収穫前に再度、ほ場内の異形株や大型雑草の抜き取りを実施してください。また、収穫の際は、倒伏している箇所の刈り分けを実施し、品質低下を防ぎましょう。

また、赤かび病の罹病株は早めに抜き取りし、収穫時は刈り分けをしてください。

４ 適期収穫で品質向上

適期刈り取りが麦の品質を大きく左右します。コンバイン収穫に適した子実水分（30%以下）に達するには、成熟期からさらに３～５日程度を要します。好天が続く日を見計らい、適期収穫に努めましょう。

表２　子実水分の判定方法と収穫体系

子実水分	子実の簡易判定	時期の目安	コンバインの種類	
			自脱型	普通型
37～35%	指でやっとつぶれる（固いゴム状）～指の腹でつぶれない（ロウ状）	成熟期前後	×～△	○
30%	子実内部が硬いロウ状になり爪でパカッと割れる	成熟期後～3日後	○	
25%	爪でなんとか割れる固さ	成熟期3～5日後		